

Verwendung von Materialien aus Rindern in Nahrungsmitteln, z.B. Würste mit Därmen von Rindern, aber auch Fleisch (Steaks usw.) und Kosmetika (vor allem Lippenstifte) können gefährlich sein. Einige Menschen erkranken zwar an der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, aber nicht sehr viele. Denn es dauert meistens Jahrzehnte, bis die Krankheit ausbricht. Es stellt sich zudem auch die Frage, ob sie dann richtig diagnostiziert wird. Wahrscheinlich sterben vor Ausbruch der Erkrankung die meisten Menschen an einer durch Tierprodukte verursachten anderen Erkrankung.

Derzeit werden pro Jahr rund 15'000 Menschen inkubiert. Zahlen aus Grossbritannien. Weniger als 200 Briten sind bisher an einer Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit gestorben, aber die Inkubationszeit für diese ausnahmslos tödliche neurodegenerative Krankheit kann Jahrzehnte betragen.

Quellen:

- [Food and Drug Administration, HHS. Verwendung von Materialien aus Rindern in Nahrungsmitteln und Kosmetika für Menschen; Wiedereröffnung der Kommentarfrist. Vorläufige Schlussregel; Wiedereröffnung der Kommentarfrist. Fed-Register. 4. März 2013;78\(42\):14012-3.](#)
- [Schreiben der Soap and Detergent Association an die FDA. 10. Februar 2004.](#)
- [Brief der Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association an das Zentrum für Lebensmittelsicherheit und angewandte Ernährung. 3. Februar 2004.](#)
- [Brief von S Foods an die FDA. 27. Juli 2004.](#)
- [Okada H, Miyazawa K, Fukuda S, Iwamaru Y, Imamura M, Masujin K, Matsuura Y, Fujii T, Fujii K, Kageyama S, Yoshioka M, Murayama Y, Yokoyama T. Das Vorhandensein von krankheitsassoziiertem Prionenprotein in der Skelettmuskulatur von Rindern, die mit klassischer boviner spongiformer Enzephalopathie infiziert sind. J Vet Med. Sci. Januar 2014;76\(1\):103-7.](#)
- [Gill ON, Spencer Y, Richard-Loendt A, Kelly C, Dabaghian R, Boyes L, Linehan J, Simmons M, Webb P, Bellerby P, Andrews N, Hilton DA, Ironside JW, Beck J, Poulter M, Mead S, Brandner S. Prävalentes abnormes Prionprotein in menschlichen Blinddarms nach boviner spongiformer Enzephalopathie epizootic: groß angelegte Umfrage. BMJ. 2013 Okt 15;347:f5675.](#)
- [Zusammenfassender Bericht Falluntersuchung zu kalifornischer boviner spongiformer Enzephalopathie. US-Landwirtschaftsministerium, Tier- und Pflanzengesundheitsinspektionsdienst, Veterinärdienst. Juli 2012.](#)

- [Suardi S, Vimercati C, Casalone C, Gelmetti D, Corona C, Iulini B, Mazza M, Lombardi G, Moda F, Ruggerone M, Campagnani I, Piccoli E, Catania M, Groschup MH, Balkema-Buschmann A, Caramelli M, Monaco S, Zanusso G, Tagliavini F. Infektiosität in der Skelettmuskulatur von Rindern mit atypischer boviner spongiformer Enzephalopathie. Plus eins. 2012;7\(2\):e31449.](#)